

protex[®] ultra

lingettes désinfectantes

One-Step⁴/Disinfectant⁶/Sanitizer⁷

Lingettes désinfectantes préimbibées

- Tue 99,9 % des bactéries en seulement 15 secondes
- Efficaces en présence de 5 % de contamination sérique
- Désinfectant hospitalier
- Efficaces en 4 minutes contre le Coronavirus lié au SRAS (SRAS-CoV-2)

Les lingettes désinfectantes Protex Ultra sont efficaces Contre :

- Staphylococcus aureus polypharmacorésistant
- Staphylococcus aureus de résistance intermédiaire à la vancomycine-VISA
- Pseudomonas aeruginosa • Burkholderia cepacia
- Virus de l'hépatite B [VHB] • Virus de l'hépatite C [VHC]
- VIH-1 (Virus du Sida) • Coronavirus 2 lié au SRAS (SRAS-CoV-2) (cause du COVID-19)

Ingrédients actifs:

Chlorure de dicyldiméthylammonium.....	0,0909 %
Chlorure de diméthylidiméthylammonium.....	0,0364 %
Chlorure de didécyldiméthylammonium.....	0,0545 %
Alkyle (C ₁₄ , 50 %; C ₁₂ , 40 %; C ₁₆ , 10 %)	
Chlorure d'ammonium de benzyle de diméthyle..	0,1212 %
Autres ingrédients :	99,6970 %
Total.....	100,0000 % ¹

¹Inclut le poids de lingette absorbante

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT

Voir au dos pour obtenir les mises en garde et les mesures de premiers secours

Utiliser des lingettes désinfectantes Protex Ultra

Dans : Les ambulances • Les cabinets dentaires • Les véhicules d'urgence • Les installations de sport • Les clubs de santé • Les hôpitaux • Les vestiaires • Les cabinets de médecins

Utiliser des lingettes désinfectantes Protex Ultra

sur des surfaces dures et non poreuses lavables des : Surfaces des dispositifs médicaux des dispositifs médicaux non-critiques • Défibrillateurs • Réanimateurs • Stéthoscopes • Transducteurs et équipement à ultrasons

Autres surfaces dures et non poreuses en : Bois fini • Métal • Plastique • Acier inoxydable • Capitonnage et rembourrage - vinyle et en plastique

Pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures non poreuses des équipements des salles de sport, des appareils d'exercices, des tapis de sport et des équipements de sport.

Les lingettes désinfectantes Protex Ultra tuent: Les bactéries

Les Acinetobacter baumannii, Corynebacterium ammoniagenes, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [CA-SARM] [NRS384] [USA300], Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis-résistant à la vancomycine [VRE], ESBL Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae (NDM-1), pneumophilie DePuyella, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Salmonella enterica, Salmonella schottmuelleri, Salmonella typhi, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [SARM], Staphylococcus aureus multirésistant, Staphylococcus aureus résistant à la vancomycine [VISA], Streptococcus pyogenes, Vibrio cholerae

Les virus

*Virus de l'hépatite B [VHB], *Virus de l'hépatite C [VHC], *Virus de l'herpès simplex type 1, *Virus de l'herpès simplex type 2, *VIRUS DU VIH-1 [VIRUS DU VIH], *Coronavirus humain, *Grippe type de grippe A/Brazil Flu, *Virus syncytial respiratoire, *Coronavirus lié au SRAS 2 (SRAS-CoV-2)(cause du COVID-19), *Virus de la vaccine

Pour ouvrir l'emballage: Retirer lentement l'étiquette. Retirer la lingette au besoin. Pour retenir l'humidité, resceller en appuyant fermement sur le joint sur la poche.

MODE D'EMPLOI

Le non-respect des indications figurant sur l'étiquette lors de l'utilisation de ce produit constitue une violation des lois fédérales. Ne pas utiliser comme une lingette nettoyante ni pour l'hygiène personnelle.

Ceci n'est pas une lingette pour bébés! Ne pas rincer dans les toilettes.

Pour les surfaces en plastique et les surfaces peintes, tester les taches sur une zone non visible avant utilisation. N'endommagera pas la plupart des surfaces: y compris acrylique, fibre de verre et vinyle scellé.

POUR NETTOYER ET DÉSINFECTER/VIRUCIDAL*:

Essuyer la surface dure non poreuse avec une lingette jusqu'à ce qu'elle soit visiblement humide. Laisser la surface humide pendant 4 minutes. Laisser la surface sécher à l'air libre. Si les surfaces sont visiblement sales, nettoyer d'abord avec une autre lingette avant la désinfection. Jeter la lingette utilisée dans la poubelle. Ne pas rincer dans les toilettes.

***TUE LE VIH, LE VHB ET LE VHC SUR DES SURFACES ENVIRONNEMENTALES PRÉ-NETTOYÉES / DES OBJETS PRÉALABLEMENT SOUILLÉS DE SANG / DE LIQUIDES CORPORELS** dans des établissements de soins de santé ou d'autres environnements dans lesquels il existe une probabilité prévue de surfaces/objets inanimés souillés de sang ou de liquides corporels, et dans lesquels les surfaces/objets susceptibles d'être souillés de sang ou de liquides corporels peuvent être associés au risque de transmission du virus de l'immunodéficience humaine de type 1 [VIH-1] ou du virus de l'hépatite B [VHB] ou du virus de l'hépatite C [VHC].

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION CONTRE LE VIH-1 OU LE VHB OU LE VHC SUR DES SURFACES / OBJETS SOUILLÉS DE SANG/LIQUIDES CORPORELS.

Protection personnelle: le nettoyage doit toujours être réalisé en portant des gants de protection, des blouses, des masques et une protection oculaire.

Procédure de nettoyage: le sang et autres liquides corporels contenant les virus VIH, VHB ou VHC doivent être soigneusement nettoyés des surfaces et des objets avant l'application des lingettes désinfectantes Protex. Les lingettes désinfectantes Protex Ultra peuvent être utilisées à cette fin.

Temps de contact: laisser la surface humide pendant 1 minute (60 secondes) pour le VIH-1. Utiliser le temps de contact approprié comme indiqué sur l'étiquette pour tous les autres virus et bactéries indiqués.

Élimination des matières infectieuses: le sang, les fluides corporels, les produits de nettoyage et

les vêtements doivent être éliminés conformément aux réglementations locales relatives à la mise au rebut des déchets infectieux.

DÉSINFECTION: désinfecter les surfaces de contact dures, non poreuses et non alimentaires; essuyer la surface en utilisant suffisamment de lingettes pour permettre à la surface traitée de rester humide pendant 15 secondes pour le Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae et Campylobacter jejuni. Laisser la surface sécher. Pour les surfaces visiblement souillées, nettoyer d'abord l'excédent de saleté.

Ce produit ne doit pas être utilisé comme stérilisateur terminal / désinfectant de haut niveau sur une surface ou un instrument qui est introduit directement dans le corps humain, dans ou en contact avec la circulation sanguine ou des zones normalement stériles du corps, ou entrant en contact avec des membranes muqueuses intactes mais qui ne pénètrent pas normalement dans la barrière sanguine ou n'entrent pas dans des zones normalement stériles du corps. Ce produit peut être utilisé pour pré-nettoyer ou décontaminer des dispositifs médicaux critiques ou semi-critiques avant stérilisation ou désinfection de haut niveau.

CONSERVATION ET ÉLIMINATION

Conserver dans le récipient original dans des endroits inaccessibles aux enfants. Maintenir bien fermé. Récipient non rechargeable. Ne pas réutiliser ni recharger ce récipient. Jeter le récipient vide dans la poubelle ou le recycler (si disponible).

MISES EN GARDE SUR LES DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES

Avertissement. Provoque une irritation oculaire modérée. Éviter tout contact avec les yeux ou les vêtements. Laver soigneusement avec du savon et de l'eau après manipulation et avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes.

PREMIERS SECOURS

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: maintenir l'œil ouvert, rincer lentement et délicatement à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, au bout des 5 premières minutes et continuer le rinçage de l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Lorsque vous appelez un centre antipoison ou un médecin ou que vous vous rendez pour un traitement, vous devez prendre avec vous le récipient ou l'étiquette du produit.

⁴Sur des surfaces dures, non poreuses et non alimentaires

⁶Lorsqu'elles sont utilisées conformément aux instructions de désinfection

⁷Lorsqu'elles sont utilisées conformément aux instructions de désinfection

FABRIQUÉ POUR :



Parker Laboratories, Inc.
286 Eldridge Road
Fairfield, NJ 07004
parkerlabs.com

Contenu net : 60 lingettes désinfectantes préimbibées de 6,5 in. X 6 in.
Wt. minimum : 9.7 Oz.

Numéro d'enregistrement EPA 6836-340-82613
Epa Establishment No. 95598-AZ-1

Questions? Commentaires?
Appeler le 1-800-631-8888

WB-002-4840A

protex[®] ultra

lingettes désinfectantes

One-Step⁴/Disinfectant⁶/Sanitizer⁷

Lingettes désinfectantes préimbibées

- Tue 99,9 % des bactéries en seulement 15 secondes
- Efficaces en présence de 5 % de contamination sérique
- Désinfectant hospitalier
- Efficaces en 4 minutes contre le Coronavirus lié au SRAS24 (SRAS-CoV-2)

Les lingettes désinfectantes Protex Ultra sont efficaces Contre :

- Staphylococcus aureus polypharmacorésistant
- Staphylococcus aureus de résistance intermédiaire à la vancomycine-VISA
- Pseudomonas aeruginosa
- Burkholderia cepacia
- *Virus de l'hépatite B [VHB]
- *Virus de l'hépatite C [VHC]
- *VIH-1 (Virus du Sida)
- *Coronavirus 2 lié au SRAS (SRAS-CoV-2) (cause du COVID-19)

Ingrédients actifs:

Chlorure de dicyldiméthylammonium.....	0,0909 %
Chlorure de diméthyl-diocetyl ammonium.....	0,0364 %
Chlorure de didécyldiméthyl ammonium.....	0,0545 %
Alkyle (C ₁₄ , 50 %; C ₁₂ , 40 %; C ₁₆ , 10 %)	
Chlorure d'ammonium de benzyle de diméthyle.....	0,1212 %
Autres ingrédients :	99,6970 %
Total.....	100,0000 % ¹

¹ Inclut le poids de lingette absorbante

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT Voir au dos pour obtenir les mises en garde et les mesures de premiers secours

Utiliser des lingettes désinfectantes Protex Ultra

Dans : Les ambulances • Les cabinets dentaires • Les véhicules d'urgence • Les installations de sport • Les clubs de santé • Les hôpitaux • Les vestiaires • Les cabinets de médecins

Utiliser des lingettes désinfectantes Protex Ultra

sur des surfaces dures et non poreuses lavables des : Surfaces des dispositifs médicaux des dispositifs médicaux non-critiques : Défibrillateurs • Réanimateurs • Stéthoscopes • Transducteurs et équipement à ultrasons

Autres surfaces dures et non poreuses en : Bois fini • Métal • Plastique • Acier inoxydable • Capitonnage et rembourrage - vinyle et en plastique

Pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures non poreuses des équipements des salles de sport, des appareils d'exercices, des tapis de sport et des équipements de sport.

Les lingettes désinfectantes Protex Ultra tuent: Les bactéries

Les Acinetobacter baumannii, Corynebacterium ammoniagenes, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [CA-SARM] [NRS384] [USA300], Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis-résistant à la vancomycine [VRE], ESBL Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae (NDM-1), pneumophilie DePuyella, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Salmonella enterica, Salmonella schottmuelleri, Salmonella typhi, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [SARM], Staphylococcus aureus multirésistant, Staphylococcus aureus résistant à la vancomycine [VISA], Streptococcus pyogenes, Vibrio cholerae

Les virus

*Virus de l'hépatite B [VHB], *Virus de l'hépatite C [VHC], *Virus de l'herpès simplex type 1, *Virus de l'herpès simplex type 2, *VIRUS DU VIH-1 [VIRUS DU VIH], *Coronavirus humain, *Grippe type de grippe A/Brazil Flu, *Virus syncytial respiratoire, *Coronavirus lié au SRAS 2 (SRAS-CoV-2)(cause du COVID-19), *Virus de la vaccine

Pour ouvrir l'emballage: Retirer lentement l'étiquette. Retirer la lingette au besoin. Pour retirer l'humidité, resserrer en appuyant fermement sur le joint sur la poche.

MODE D'EMPLOI

Le non-respect des indications figurant sur l'étiquette lors de l'utilisation de ce produit constitue une violation des lois fédérales. Ne pas utiliser comme une lingette nettoyante ni pour l'hygiène personnelle.

Ceci n'est pas une lingette pour bébés !
Ne pas rincer dans les toilettes.

Pour les surfaces en plastique et les surfaces peintes, tester les taches sur une zone non visible avant utilisation. N'endommagera pas la plupart des surfaces: y compris acrylique, fibre de verre et vinyle scellé.

POUR NETTOYER ET DÉSINFECTER/VIRUCIDAL*:

Essuyer la surface dure non poreuse avec une lingette jusqu'à ce qu'elle soit visiblement humide. Laisser la surface humide pendant 4 minutes. Laisser la surface sécher à l'air libre. Si les surfaces sont visiblement sales, nettoyer d'abord avec une autre lingette avant la désinfection. Jeter la lingette utilisée dans la poubelle. Ne pas rincer dans les toilettes.

***TUE LE VIH, LE VHB ET LE VHC SUR DES SURFACES ENVIRONNEMENTALES PRÉ-NETTOYÉES / DES OBJETS PRÉALABLEMENT SOUILLÉS DE SANG / DE LIQUIDES CORPORELS** dans des établissements de soins de santé ou d'autres environnements dans lesquels il existe une probabilité prévue de surfaces/objets inanimés souillés de sang ou de liquides corporels, et dans lesquels les surfaces/objets susceptibles d'être souillés de sang ou de liquides corporels peuvent être associés au risque de transmission du virus de l'immunodéficience humaine de type 1 [VIH-1] ou du virus de l'hépatite B [VHB] ou du virus de l'hépatite C [VHC].

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION CONTRE LE VIH-1 OU LE VHB OU LE VHC SUR DES SURFACES / OBJETS SOUILLÉS DE SANG/LIQUIDES CORPORELS.

Protection personnelle: Le nettoyage doit toujours être réalisé en portant des gants de protection, des blouses, des masques et une protection oculaire.

Procédure de nettoyage: Le sang et autres liquides corporels contenant les virus VIH, VHB ou VHC doivent être soigneusement nettoyés des surfaces et des objets avant l'application des lingettes désinfectantes Protex. Les lingettes désinfectantes Protex Ultra peuvent être utilisées à cette fin.

Temps de contact: Laisser la surface humide pendant 1 minute (60 secondes) pour le VIH-1. Utiliser le temps de contact approprié comme indiqué sur l'étiquette pour tous les autres virus et bactéries indiqués.

Élimination des matières infectieuses: Le sang, les fluides corporels, les produits de nettoyage

et les vêtements doivent être éliminés conformément aux réglementations locales relatives à la mise au rebut des déchets infectieux.

DÉSINFECTION: Désinfecter les surfaces de contact dures, non poreuses et non alimentaires; essuyer la surface en utilisant suffisamment de lingettes pour permettre à la surface traitée de rester humide pendant 15 secondes pour le Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae et Campylobacter jejuni. Laisser la surface sécher. Pour les surfaces visiblement souillées, nettoyer d'abord l'excédent de saleté.

Ce produit ne doit pas être utilisé comme stérilisateur terminal / désinfectant de haut niveau sur une surface ou un instrument qui est introduit directement dans le corps humain, dans ou en contact avec la circulation sanguine ou des zones normalement stériles du corps, ou entrant en contact avec des membranes muqueuses intactes mais qui ne pénètrent pas normalement dans la barrière sanguine ou n'entrent pas dans des zones normalement stériles du corps. Ce produit peut être utilisé pour pré-nettoyer ou décontaminer des dispositifs médicaux critiques ou semi-critiques avant stérilisation ou désinfection de haut niveau.

CONSERVATION ET ÉLIMINATION

Conserver dans le récipient original dans des endroits inaccessibles aux enfants. Maintenir bien fermé. Récipient non rechargeable. Ne pas réutiliser ni recharger ce récipient. Jeter le récipient vide dans la poubelle ou le recycler (si disponible).

MISES EN GARDE SUR LES DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES

Avvertissement. Provoque une irritation oculaire modérée. Éviter tout contact avec les yeux ou les vêtements. Laver soigneusement avec du savon et de l'eau après manipulation et avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes.

PREMIERS SECOURS

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Maintenir l'œil ouvert, rincer lentement et délicatement à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, au bout des 5 premières minutes et continuer le rinçage de l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Lorsque vous appelez un centre antipoison ou un médecin ou que vous vous rendez pour un traitement, vous devez prendre avec vous le récipient ou l'étiquette du produit.

⁴ Sur des surfaces dures, non poreuses et non alimentaires

⁶ Lorsqu'elles sont utilisées conformément aux instructions de désinfection

⁷ Lorsqu'elles sont utilisées conformément aux instructions de désinfection

FABRIQUÉES POUR :



Parker Laboratories, Inc.
286 Eldridge Road
Fairfield, NJ 07004
parkerlabs.com

Contenu net: 80 lingettes désinfectantes préimbibées, 7 in. X 10 in.
Poids minimum: 1.45 lbs

N° d'enregistrement EPA 6836-340-82613
N° d'établissement EPA 95598-AZ-1

Questions? Commentaires?
Appeler le 1-800-631-8888

WB-003-4872A

proteX[®] ultra

lingettes désinfectantes

One-Step⁴/Disinfectant⁶/Sanitizer⁷

Lingettes désinfectantes préimbibées

- Tuent 99,9 % des bactéries en seulement 15 secondes • Efficaces en présence de 5 % de contamination sérique
- Désinfectant hospitalier • Efficaces en 4 minutes contre le Coronavirus lié au SRAS24 (SRAS-CoV-2)

Ingrédients actifs:

Chlorure de décyl diméthyl octyl ammonium.....	0,0909 %
Chlorure de diméthyl diocetyl ammonium.....	0,0364 %
Chlorure de didécyl diméthyl ammonium.....	0,0545 %
Alkyle (C ₁₄ , 50 %; C ₁₂ , 40 %; C ₁₆ , 10 %)	
Chlorure d'ammonium de benzyle de diméthyle.....	0,1212 %
Autres ingrédients :	99,6970 %
Total.....	100,0000 % ¹

¹Inclut le poids de lingette absorbante

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

AVERTISSEMENT Voir au dos pour obtenir les mises en garde et les mesures de premiers secours

Utiliser des lingettes désinfectantes Protex Ultra

Dans : Les ambulances • Les cabinets dentaires • Les véhicules d'urgence • Les installations de sport • Les clubs de santé • Les hôpitaux • Les vestiaires • Les cabinets de médecins

Utiliser des lingettes désinfectantes Protex Ultra

sur des surfaces dures et non poreuses lavables des: Surfaces des dispositifs médicaux des dispositifs médicaux non-critiques : Défibrateurs • Réanimateurs • Stéthoscopes • Transducteurs et équipement à ultrasons

Autres surfaces dures et non poreuses en : Bois fini • Métal • Plastique • Acier inoxydable • Capotage et rembourrage - vinyle et en plastique

• Pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures non poreuses des équipements des salles de sport, des appareils d'exercices, des tapis de sport et des équipements de sport.

Les lingettes désinfectantes Protex Ultra tuent: Les bactéries

Acinetobacter baumannii, Corynebacterium ammoniogenes, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus résistants à la méthicilline [CA-SARM] [NRS384] [USA300], Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis résistants à la vancomycine [VRE], ESBL Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae (NDM-1), pneumophilie DePuyella, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Salmonella enterica, Salmonella schottmuelleri, Salmonella typhi, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [SARM], Staphylococcus aureus multirésistant, Staphylococcus aureus résistant à la vancomycine [VISA], Streptococcus pyogenes, Vibrio cholerae

Les virus

*Virus de l'hépatite B [VHB], *Virus de l'hépatite C [VHC], *Virus de l'herpès simplex type 1, *Virus de l'herpès simplex type 2, *VIRUS DU VIH-1 [VIRUS DU VIH], *Coronavirus humain, *Grippe type de grippe A/Brazil Flu, *Virus syncytial respiratoire, *Coronavirus lié au SRAS 2 (SRAS-CoV-2)(cause du COVID-19), *Virus de la vaccine

Ouverture de l'emballage: Ouvrir le couvercle.

Pour retirer la première lingette, retirer le bord de la lingette de la grande ouverture à la petite ouverture de distribution et tirer vers le haut. Toujours fermer solidement le couvercle entre les utilisations pour conserver l'humidité.

MODE D'EMPLOI

Le non-respect des indications figurant sur l'étiquette lors de l'utilisation de ce produit constitue une violation des lois fédérales. Ne pas utiliser comme une lingette nettoyante ni pour l'hygiène personnelle.

Ceci n'est pas une lingette pour bébés !

Ne pas rincer dans les toilettes.

Pour les surfaces en plastique et les surfaces peintes, tester les taches sur une zone non visible avant utilisation. N'endommagera pas la plupart des surfaces: y compris acrylique, fibre de verre et vinyle scellé.

POUR NETTOYER ET DÉSINFECTER/VIRUCIDAL*:

Essuyer la surface dure non poreuse avec une lingette jusqu'à ce qu'elle soit visiblement humide. Laisser la surface humide pendant 4 minutes. Laisser la surface sécher à l'air libre. Si les surfaces sont visiblement sales, nettoyer d'abord avec une autre lingette avant la désinfection. Jeter la lingette utilisée dans la poubelle. Ne pas rincer dans les toilettes.

***TUE LE VIH, LE VHB ET LE VHC SUR DES SURFACES ENVIRONNEMENTALES PRÉ-NETTOYÉES / DES OBJETS PRÉALABLEMENT SOUILLÉS DE SANG / DE LIQUIDES CORPORELS** dans des établissements de soins de santé ou d'autres environnements dans lesquels il existe une probabilité prévue de surfaces/objets inanimés souillés de sang ou de liquides corporels, et dans lesquels les surfaces/objets susceptibles d'être souillés de sang ou de liquides corporels peuvent être associés au risque de transmission du virus de l'immunodéficience humaine de type 1 [VIH-1] ou du virus de l'hépatite B [VHB] ou du virus de l'hépatite C [VHC].

INSTRUCTIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION CONTRE LE VIH-1 OU LE VHB OU LE VHC SUR DES SURFACES / OBJETS SOUILLÉS AU SANG / LIQUIDES CORPORELS.

Protection personnelle: Le nettoyage doit toujours être fait en portant des gants de protection, des blouses, des masques et une protection oculaire.

Procédure de nettoyage: Les sang et les autres liquides corporels contenant le VIH, le VHB ou le VHC doivent être soigneusement nettoyés des surfaces et des objets avant l'application des lingettes désinfectantes Protex. Les lingettes désinfectantes Protex Ultra peuvent être utilisées à cette fin.

Temps de contact: Laisser la surface humide pendant 1 minute (60 secondes) pour le VIH-1. Utiliser le temps de contact approprié comme répertorié sur l'étiquette pour tous les autres virus et bactéries indiqués.

Élimination des matières infectieuses: Le sang, les liquides corporels, les matériaux de nettoyage et les vêtements doivent être éliminés conformément aux réglementations locales pour l'élimination des déchets infectieux.

ASSAINISSEMENT: Pour assurer l'assainissement des surfaces de contact dures, non poreuses et non alimentaires; essuyer la surface en utilisant suffisamment de lingettes pour permettre à la surface traitée de rester humide pendant 15 secondes pour le Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae et Campylobacter jejuni. Laisser la surface sécher. Pour les surfaces visiblement souillées, nettoyer d'abord l'excédent de saleté.

Ce produit ne doit pas être utilisé comme stérilisateur terminal / désinfectant de haut niveau sur une surface ou un instrument qui est introduit directement dans le corps humain, dans ou en contact avec la circulation sanguine ou des zones normalement stériles du corps, ou entrant en contact avec des membranes muqueuses intactes mais qui ne pénètrent pas normalement dans la barrière sanguine ou n'entrent pas dans des zones normalement stériles du corps. Ce produit peut être utilisé pour pré-nettoyer ou décontaminer des dispositifs médicaux critiques ou semi-critiques avant stérilisation ou désinfection de haut niveau.

CONSERVATION ET ÉLIMINATION

Conserver dans le récipient original dans des endroits inaccessibles aux enfants. Maintenir bien fermé. Récipient non rechargeable. Ne pas réutiliser ni recharger ce récipient. Jeter le récipient vide dans la poubelle ou le recycler (si disponible).

MISES EN GARDE

DANGERS POUR LES HUMAINS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES

Avvertissement. Provoque une irritation oculaire modérée. Éviter tout contact avec les yeux ou les vêtements. Laver soigneusement avec du savon et de l'eau après manipulation et avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes.

PREMIERS SECOURS

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Maintenir l'œil ouvert, rincer lentement et délicatement à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, au bout des 5 premières minutes et continuer le rinçage de l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Lorsque vous appelez un centre antipoison ou un médecin ou que vous vous rendez pour un traitement, vous devez prendre avec vous le récipient ou l'étiquette du produit.

⁴Sur des surfaces dures, non poreuses et non alimentaires

⁶Lorsqu'elles sont utilisées conformément aux instructions de désinfection

⁷Lorsqu'elles sont utilisées conformément aux instructions de désinfection

FABRIQUÉES POUR :



Parker Laboratories Inc.
286 Eldridge Road
Fairfield, NJ 07004
parkerlabs.com

Contenu net : 75 lingettes pré-humides, 7" x 9,5"
Poids minimum : 1,30 lbs

N° d'enregistrement EPA 6836-340-82613
N° d'établissement EPA 95598-AZ-1

Questions? Commentaires?
Appeler le 1-800-631-8888

WB-048-0001A